

肾脏疾病患者 服用 Paxlovid



Paxlovid 适用于感染 COVID-19 病毒的某些患者,可以帮助患者迅速康复和免于接受住院治疗。

如果您患有肾脏疾病,可能需要降低 Paxlovid 剂量。因此,您需要按此资料单中的说明服用此药。

Paxlovid 由以下两种抗病毒药物组成 - nirmatrelvir (粉色片剂) 和 ritonavir (白色片剂)。两种药物合用时,可以降低患者体内的病毒量。Paxlovid 只在感染 COVID-19 后的 5 天内给药时有效,所以将由医生决定您是否需要此药物。

如下所述,每天两次,每次服用 2 片,持续服用五天



每天早晨

服用 1 片粉色片剂,外加
1 片白色片剂

(片剂均在铝箔泡罩的
黄色部分中)



每天晚间

服用 1 片粉色片剂,外加
1 片白色片剂

(片剂均在铝箔泡罩的
蓝色部分中)

患者需要完成一个疗程,
即 5 天。

可以在或不在用餐时服用。

在未告知您的医务人员
之前,请勿停止服用
Paxlovid,
即使您自我感觉改善。

将您服用的所有药物告诉 您的医疗保健提供者

某些药物可能不应与 Paxlovid 混用,合用时
可能会引起严重副作用。

如果您正在或最近曾经服用其它药物,
包括处方药和非处方药、维生素和草药
补剂(例如圣约翰草),请告知您的医生
或药剂师。

在未告知您的医疗保健提供者之前,请勿
开始服用新药物。您的医疗保健提供者
会告诉您 Paxlovid 与其它药物合用是否
安全。

如果您漏服一剂

-  如果您在正常服药时间的 8 小时内
漏服一剂,请在想起时尽快服用。
-  如果您的漏服时间超过 8 小时,
请跳过漏服剂量,在下次正常
服药时间服用下一剂量。
-  请勿服用额外 Paxlovid 剂量以期
弥补漏服剂量。

 常见、罕见和严重副作用见下页

您是否怀孕或计划怀孕？

如果您已经怀孕、感觉您可能怀孕或正在计划怀孕，请勿服用 Paxlovid。



请征求您的医生建议，因为不建议孕妇服用 Paxlovid。

在 Paxlovid 治疗期间和治疗结束后 7 天内，女性应该避免怀孕（即采用避孕措施或禁欲）。

避孕非常重要

如果您正在服用避孕药物，应格外小心，因为 Paxlovid 可能会影响避孕药物的效果。

在 Paxlovid 治疗期间和治疗结束后 7 天内，如果您有性交活动，除了使用避孕套外，还应采用通常的避孕措施。

请征求您的医生或药剂师的建议。

您在哺乳吗？

在 Paxlovid 治疗期间和治疗结束后 7 天内，不建议哺乳。

在服用此药物之前，请告知您的医务人员，您正在哺乳。

所有药物都有一些副作用

Paxlovid 会引起副作用，尽管不是每个人都会出现副作用。

常见的副作用

这些副作用通常比较轻微，会随时间的推移或在停药后消失。如果这些副作用对您造成影响或不自动消失，请告知您的医生：

- 稀便（腹泻）
- 不适（恶心）
- 味觉改变。

罕见、严重副作用

如果您出现这些副作用，请立即联系您的医务人员或致电 **Healthline (0800 611 116)** 告知您正在服用 Paxlovid：

过敏反应体征，例如：

- 皮疹
- 眼睑或眼周围、面部、嘴唇或舌头浮肿或肿胀
- 胸闷和呼吸困难

肝脏问题体征，例如：

- 眼球或皮肤变黄
- 上腹部疼痛或不适。

 有关 Paxlovid 的更多信息，请访问网站 hn.org.nz/paxlovid